


Proportion des groupes principaux de diagnostic selon l'âge au moment du diagnostic

Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3¹ et de l'histiocytose à cellules de Langerhans; Proportion en pourcentage des cas au cours de la période 1995-2024




État des données: 21.07.2026
Publié: 07.08.2026
Source des données: RCdE, OFS

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Incidence

Par groupes principaux de diagnostics, groupe d'âge et périodes de 10 ans

Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3¹ et l'histiocytose à cellules de Langerhans; Taux brut pour 100,000 personnes par année;
Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%



État des données: 21.07.2026

Publié: 07.08.2026


Source des données: RCdE, OFS

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Incidence

Par sexe, groupes principaux de diagnostics et périodes de 10 ans

Groupes principaux de diagnostic selon la ICCC-3¹ et l'histiocytose à cellules de Langerhans; Taux brut pour 100,000 personnes par année; Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%



État des données: 21.07.2026

Publié: 07.08.2026


Source des données: RCdE, OFS

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Incidence

Par sexe, groupe d'âge et périodes de 5 ans

Taux brut pour 100,000 personnes par année; Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance à 95%



Cancer chez les enfants (0-14 ans), 2005-2014

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de cas (fréquence relative %), âge médian au moment du diagnostic (en années), incidence pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICC-3¹ et histiocytose à cellules de Langerhans

Type de cancer	n(%)	Âge au Dx (médiane)	Incidence	Sex ratio (homme: femme)
I Leucémies	645 (31.9%)	4.00	5.41	1.52
II Lymphomes	235 (11.6%)	10.00	1.97	1.73
III Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	484 (23.9%)	6.00	4.06	1.22
IV Neuroblastomes	120 (5.9%)	1.00	1.01	1.18
V Rétinoblastomes	42 (2.1%)	1.00	0.35	0.83
VI Tumeurs rénales	98 (4.8%)	3.00	0.82	0.78
VII Tumeurs du foie	18 (0.9%)	1.00	0.15	1.57
VIII Tumeurs osseuses	83 (4.1%)	11.00	0.70	0.93
IX Sarcome des tissus mous	142 (7.0%)	7.00	1.19	1.33
X Tumeurs des cellules germinales	64 (3.2%)	6.00	0.54	1.13
XI Autres carcinomes et mélanomes	90 (4.4%)	12.00	0.75	0.48
XII Autres et néoplasmes non spécifiés	4 (0.2%)	1.50	0.03	3.00
Total (hors histiocytose à cellules de Langerhans)	2025 (100.0%)	6.00	16.99	1.26
Histiocytose à cellules de Langerhans	42 (2.0%)	4.50	0.35	1.21
Total (y compris l'histiocytose à cellules de Langerhans)	2067 (100.0%)	6.00	17.34	1.26

Abréviations: Dx diagnostic

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 21.07.2026

Publié: 07.08.2026

Source des données: RCdE, OFS

Cancer chez les enfants (0-14 ans), 2015-2024

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de cas (fréquence relative %), âge médian au moment du diagnostic (en années), incidence pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICC-3¹ et histiocytose à cellules de Langerhans

Type de cancer	n(%)	Âge au Dx (médiane)	Incidence	Sex ratio (homme: femme)
I Leucémies	642 (26.9%)	5.00	4.97	1.23
II Lymphomes	271 (11.3%)	9.00	2.10	2.01
III Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	646 (27.1%)	7.00	5.00	1.01
IV Neuroblastomes	151 (6.3%)	1.00	1.17	0.99
V Rétinoblastomes	64 (2.7%)	0.00	0.50	1.46
VI Tumeurs rénales	113 (4.7%)	3.00	0.87	0.92
VII Tumeurs du foie	37 (1.5%)	1.00	0.29	1.18
VIII Tumeurs osseuses	103 (4.3%)	11.00	0.80	0.66
IX Sarcome des tissus mous	141 (5.9%)	5.00	1.09	0.74
X Tumeurs des cellules germinales	68 (2.8%)	10.00	0.53	0.79
XI Autres carcinomes et mélanomes	146 (6.1%)	12.00	1.13	0.82
XII Autres et néoplasmes non spécifiés	6 (0.3%)	7.00	0.05	0.20
Total (hors histiocytose à cellules de Langerhans)	2388 (100.0%)	6.00	18.48	1.09
Histiocytose à cellules de Langerhans	58 (2.4%)	5.50	0.45	0.76
Total (y compris l'histiocytose à cellules de Langerhans)	2446 (100.0%)	6.00	18.93	1.08

Abréviations: Dx diagnostic

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 21.07.2026

Publié: 07.08.2026

Source des données: RCdE, OFS

Cancer chez les adolescents (15-19 ans), 2005-2014

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de cas (fréquence relative %), âge médian au moment du diagnostic (en années), incidence pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICC-3¹ et histiocytose à cellules de Langerhans

Type de cancer	n(%)	Âge au Dx (médiane)	Incidence	Sex ratio (homme: femme)
I Leucémies	106 (9.1%)	16.00	2.37	1.52
II Lymphomes	279 (24.0%)	17.00	6.24	1.03
III Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	168 (14.5%)	16.00	3.76	1.20
IV Neuroblastomes	3 (0.2%)	18.50	0.06	NA*
V Rétinoblastomes	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumeurs rénales	11 (1.0%)	16.50	0.25	1.43
VII Tumeurs du foie	4 (0.4%)	18.00	0.09	NA*
VIII Tumeurs osseuses	69 (6.0%)	16.00	1.55	1.40
IX Sarcome des tissus mous	74 (6.4%)	16.50	1.66	1.51
X Tumeurs des cellules germinales	152 (13.1%)	18.00	3.40	5.23
XI Autres carcinomes et mélanomes	288 (24.8%)	18.00	6.45	0.55
XII Autres et néoplasmes non spécifiés	7 (0.6%)	17.00	0.15	0.85
Total (hors histiocytose à cellules de Langerhans)	1161 (100.0%)	17.00	25.99	1.18
Histiocytose à cellules de Langerhans	2 (0.2%)	19.00	0.04	NA*
Total (y compris l'histiocytose à cellules de Langerhans)	1162 (100.0%)	17.00	26.03	1.18

Abréviations: Dx diagnostic, NA non applicable (*données non présentées pour empêcher la divulgation de l'âge/du sexe des patients individuels)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 21.07.2026

Publié: 07.08.2026

Source des données: RCdE, OFS

Cancer chez les adolescents (15-19 ans), 2015-2024

Par les groupes principaux de diagnostic

Nombre de cas (fréquence relative %), âge médian au moment du diagnostic (en années), incidence pour 100,000 personnes par année, et sex-ratio; Groupes principaux de diagnostic selon la ICC-3¹ et histiocytose à cellules de Langerhans

Type de cancer	n(%)	Âge au Dx (médiane)	Incidence	Sex ratio (homme: femme)
I Leucémies	129 (10.8%)	17.0	2.98	1.67
II Lymphomes	291 (24.4%)	17.0	6.75	1.29
III Tumeurs du cerveau et autres tumeurs du SNC	231 (19.3%)	17.0	5.34	0.70
IV Neuroblastomes	9 (0.8%)	17.0	0.21	0.15
V Rétinoblastomes	1 (0.1%)	NA*	0.03	NA*
VI Tumeurs rénales	8 (0.6%)	16.0	0.18	0.73
VII Tumeurs du foie	1 (0.1%)	NA*	0.02	NA*
VIII Tumeurs osseuses	69 (5.7%)	17.0	1.59	1.75
IX Sarcome des tissus mous	66 (5.5%)	17.0	1.52	1.42
X Tumeurs des cellules germinales	114 (9.5%)	17.0	2.63	2.97
XI Autres carcinomes et mélanomes	272 (22.8%)	17.0	6.30	0.52
XII Autres et néoplasmes non spécifiés	5 (0.4%)	17.5	0.11	NA*
Total (hors histiocytose à cellules de Langerhans)	1195 (100.0%)	17.0	27.67	1.03
Histiocytose à cellules de Langerhans	9 (0.8%)	17.0	0.21	1.71
Total (y compris l'histiocytose à cellules de Langerhans)	1204 (100.0%)	17.0	27.88	1.04

Abréviations: Dx diagnostic, NA non applicable (*données non présentées pour empêcher la divulgation de l'âge/du sexe des patients individuels)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

État des données: 21.07.2026

Publié: 07.08.2026

Source des données: RCdE, OFS